

Malattia	Trasmissione e Incubazione	Sintomi Principali	Contagiosità	Periodo di Contagiosità	Durata Malattia	Aspetto dell'Esantema	Localizzazione
Morbillo	Via aerea 7-14 giorni	Febbre alta, tosse, naso che cola, occhi arrossati, macchie di Koplik (punti bianchi nella bocca), rash cutaneo	Altissima (R0: 12-18)	Da 4 giorni prima a 4 giorni dopo l'eruzione del rash	7-10 giorni	Macchie rosso-brunastre, confluenti, iniziano sul viso e si diffondono su tutto il corpo	Inizia sul viso e dietro le orecchie, si diffonde su tutto il corpo
Rosolia	Via aerea 14-21 giorni	Febbre lieve, mal di gola, rash cutaneo, linfonodi ingrossati, artralgia (dolori articolari)	Alta (R0: 5-7)	Da 7 giorni prima a 7 giorni dopo l'eruzione del rash	3-7 giorni	Maculopapulare rosa, inizia sul viso e si diffonde verso il basso; generalmente non confluenti	Inizia sul viso e si diffonde al tronco e agli arti superiori
Scarlattina	Via aerea, contatto diretto 1-7 giorni	Febbre alta, mal di gola, rash rosso con sensazione di carta vetrata, lingua a fragola	Moderata	Fino a 24 ore dopo l'inizio della terapia antibiotica	7-10 giorni	Piccole macchie rosse in rilievo, aspetto di carta vetrata, spesso inizia nelle pieghe cutanee (ascelle, inguine)	Inizia sul collo e sul petto, poi si diffonde al resto del corpo

Malattia	Trasmissione e Incubazione	Sintomi Principali	Contagiosità	Periodo di Contagiosità	Durata Malattia	Aspetto dell'Esantema	Localizzazione
Varicella	Via aerea, contatto diretto 7-21 giorni	Febbre, malessere, eruzione cutanea con vescicole pruriginose che si trasformano in croste	Molto alta (R0: 10-12)	Da 2 giorni prima a 5 giorni dopo l'eruzione del rash	7-10 giorni	Vescicole pruriginose su base eritematosa, evolvono in pustole e poi in croste	Tronco, viso, cuoio capelluto, bocca, gola, genitali
Mani Bocca Piedi	Via aerea, contatto diretto >7 giorni	Febbre, mal di gola, perdita di appetito, vescicole dolorose in bocca, rash cutaneo su mani e piedi	Moderata	Durante la fase acuta, più contagioso nella prima settimana	7-10 giorni	Piccole vescicole rosse dolorose su mani, piedi, e in bocca; possono essere piatte o in rilievo	Mani, piedi, bocca, talvolta glutei
Quinta malattia	Via aerea 5-7 giorni	Febbre lieve, rash cutaneo sulle guance, eruzione su tronco e arti, a volte dolori articolari	Moderata	Prima dell'inizio dei sintomi	5-10 giorni	Rash rosso acceso sulle guance, rash reticolato su tronco e arti	Guance, tronco, braccia, gambe
Sesta malattia	Via aerea, contatto diretto 5-15 giorni	Febbre alta improvvisa, che cala bruscamente, seguita da un rash cutaneo prevalentemente sul tronco	Moderata	Durante il periodo febbrile	3-7 giorni	Piccole macchie rosa, non pruriginose, che scompaiono alla pressione	Tronco, collo, a volte viso e arti